

PARLA VIRNA FRUMENTO, PRIMARIO DI IGIENE PUBBLICA

## “Mascherina e misure anti contagio frenano i casi di influenza stagionale”

Vaccinazione antinfluenzale e misure anti Covid stanno frenando l'influenza stagionale. L'utilizzo di mascherine, il distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani e le restrizioni agli spostamenti sono le misure adottate per prevenire il contagio da coronavirus e a quanto pare stanno funzionando da barriera anche contro altri virus. Emerge dall'osservazione clinica ospedaliera e da quella che arriva dal territorio, dove i me-

dici di base però avvisano che, normalmente il picco delle influenze stagionali arriva tra gennaio e febbraio, dopo la riapertura delle scuole (che quest'anno per le superiori vedranno un numero ridotto di studenti negli istituti scolastici) e degli uffici.

Ma se si guarda alla prima settimana dello scorso anno o di quelli precedenti, i pronto soccorso iniziavano già ad essere sotto pressione per l'aumento degli accessi dovuti a

pazienti colpiti da influenza, soprattutto persone anziane.

«Sicuramente tutti questi fattori insieme hanno contribuito a ridurre i contagi influenzali - spiega Virna Frumento, primario di Igiene e sanità pubblica - ma l'effetto più importante è stato quello della vaccinazione antinfluenzale. Quest'anno le dosi dei vaccini sono passate da 50 mila a 90 mila e, soprattutto le persone a rischio che hanno deciso di vaccinarsi sono aumenta-



### Norme anti Covid e distanziamento frenano l'influenza stagionale

te. Con la vaccinazione antinfluenzale abbiamo avuto buoni risultati e sono gli obiettivi che ci ponevamo. Poi le altre misure, come mascherine, lavaggio frequente

delle mani distanze sono state importanti e dimostrano quanto siano utili per evitare la diffusione dei virus, non solo quello covid-19». E.R. —